

MRSA-screening av gravida kvinnor inom MHV

Gäller för: Landstinget i Värmland	Godkänd av: Olle Wik	Utarbetad av: Birgitta Sahlström, Ann-Mari Gustavsson, Eva Andersson
Utgåva: 1	Giltighetstid: 2011-04-15 tills vidare	Reviderad av:

MRSA-screening av gravida kvinnor inom mödrahälsovård**Tillämpa basala hygienrutiner****Följande patientkategorier ska provtas för MRSA:**

- Gravida kvinnor som varit bosatta utanför Norden de senaste två (2) åren.
- Gravida kvinnor som vårdats/behandlats eller arbetat på sjukvårdsinrättning utanför Sverige de senaste sex (6) månaderna.
- Gravida kvinnor som tidigare varit bärare av MRSA.

Screenodlingarna ska tas vid första besöket hos barnmorskan.

MRSA-odling tas från:

- Näsöppning
- Svalg
- Perineum/ljumske
- Hudskada t.ex. sår, eksem

Provtagningsanvisning för MRSA-screening:

- Använd provtagnings sätt Copan (transportrör med kolat medium och pinne).
- Fukta pinnen med koksaltlösning (vid näsprov eller torra hudskador eller sår).
- Negativt odlings svar tar vanligen två (2) dygn.

Beställningen görs elektroniskt till klinisk mikrobiologi.

Prov svar går till inremitterande läkare.

Gör en beställning: MRSA/MRB-screening, exempelvis sekret-näsa, sekret-svalg.

Skriv som anamnes: Screenodling MRSA.

Mödrahälsovårdens information:

Dokumentera i rutorna för tagna prover i mödrahälsovårdsjournal 2 (MHV2) att MRSA-screening är genomförd samt provresultat.

Vid konstaterat positivt prov ska MHV2 rödmarkeras med ”**ej u a**”. Provresultatet ska anges i sammanfattningen i MHV3 och journalen i Profdoc/Swedestar ska märkas med MRSA.

Vid positivt prov svar kontakta snarast ansvarig läkare som tar kontakt med Smittskydd Värmland för vidare handläggning.