

Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande/kvotflyktingar/anhöriginvandrade eller motsvarande i Landstinget i Värmland

Vid ankomsten till Sverige erbjuds:

1. Hälsosamtal

- Tidigare sjukdomar
- Social anamnes (födelseland, flyktingstatus etc.)
- Tuberkulosanamnes
- Sjukhusvård
- Missbruk
- Kvinnors obstetriska förhållanden
- Undernäring
- Vaccinationer
- Akuta luftvägsinfektioner (difteri, pneumoni)
- Tarmsymtom
- Feberperioder
- Hematuri

2. Provtagning

- HIV-test
- HBsAg-test
- Hb och PKU på barn < 7 år
- Faecesmikroskopi x 1 till barn ≤6 år
- MRSA-prov från sår- och hudlesioner och näsan på samtliga som sjukhusvårdats före ankomsten till Sverige
- Syfilisantikroppar.
- Personer som anger urogenitala symtom bör provtas med avseende på klamydia och gonorré. Observera också att alla gravida alltid erbjuds HIV-test, HBsAg, rubellaserologi och syfilisserologi oavsett tidigare provtagning.
- Övrig provtagning: Individualiseras och tas endast vid specifika frågeställningar.
- SR på alla > 5 år.

3. Tuberkuloskontroll

- För personer från Afrika, Asien, Syd- och Mellanamerika samt Östeuropa erbjuds också tuberkulosundersökning (*utgör en riskfaktor i flödesschemat nedan*). PPD och lungröntgen rekommenderas på samtliga. Eventuell smittsamhet bedöms bäst i alla åldrar med lungröntgen. Även gravida kvinnor som kommer från aktuellt


område ska lungröntgas. Denna lungröntgen ska göras med en frontalbild i fullformat i graviditetsvecka 28 -29.

- I de fall remiss skickas till lungmedicin (patienter > 18 år) för bedömning av lungröntgen. och/eller PPD ≥ 10 mm bifogas ifyllt frågeformulär till konsultationsremissen. (Finns på Smittskydd Värmlands hemsida www.smittskyddvarmland.se)

Observera att små barn ofta har extrapulmonell tuberkulos, varför det är särskilt viktigt med PPD-undersökning på dessa. Alla med positiv lungröntgen remitteras till specialist.

Specialistremisser går till Barnkliniken, CSK (patienter 18 år och därunder) och Lungmedicin, CSK (patienter >18 år). På remisserna skall uppges om ni sett att patienten har ett ärr efter gammal BCG-vaccination.

Utredningsschema med avseende på TBC



¹ De som avlörs utan vidare uppföljning bör få en allmän information om Tuberkulosjukdomen och att de bör söka sjukvård om de får nya symptom som t.ex. hosta.