



HYGIEN

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR

Hänvisning till Lokala anvisningar i flera av
HANDBOKENS avsnitt. Se även Rätt medel.

- hud
- slemhinnor
- händer
- ytor
- instrument

Användningsområde	Produkt
Huddesinfektion <ul style="list-style-type: none">• vid operativa ingrepp• före inläggning av CVK, venflon etc• vid punktioner, injektioner• före blododling	→ klorhexidinsprit 5 mg/ml (0,5%) (även Hibiscrub/Descutan i vissa fall)
Slemhinnedesinfektion	→ Klorhexidinlösning 2 mg/ml (0,2%)
Handdesinfektion <ul style="list-style-type: none">• allmän• preop	→ Dax Handdesinfektion 60% alt Sterillium → Klorhexidinsprit 5 mg/ml (0,5%) alt Sterillium
Desinfektion av <ul style="list-style-type: none">• mindre ytor• mindre ytor efter spill av blod eller annat organiskt material (punktdesinfektion)• större ytor• slutstädning efter patient med särskild smittrisk t ex blodsmitta eller då risk för nosokomial spridning föreligger• Clostridium difficile diarré: spill av avföring, daglig desinfektion av toalettstol och slutstädning av säng, sängbord, tvättställ och toalett.	→ LT-CIN → Perform 2,0% alt Virkon 1% → Kloramin 5% alt → Perform 2% alt → Virkon 3%
Desinfektion av flergångsgods <ul style="list-style-type: none">• instrument, mindre mängd• specialinstrument	→ LT-cin → LT-CIN → SBS-Glutar alt Cidex