

MRB - Vårdrutiner operationsavdelning



– för patienter som är bärare av multiresistenta bakterier (MRB)

(För ESBL – se separat rutin "ESBL, Handläggning av patient med bärarskap av ESBL-bildande bakterier - Vårdrutin för An/Op/IVA/UVA")

Planering


- Planera dag och tid.
- Planera omhändertagandet vid operationsavdelningen och postoperativa avdelningen/IVA (enkelrum) alternativt postoperativ övervakning på operationssal – åter till egen avdelning.
- Minimera antalet personal som har direktkontakt med patienten (dokumentera i journalen vem som har deltagit).
- Personal med hudlesionser ska ej delta i vård av patient med MRB.
- Ventilation på operationssalen ställs om till oren operation, d v s undertryck på salen.

Patientförberedelse på avdelningen

- Patienten duschas eller tvättas med Hibiscrub x 2.
- Rena kläder.
- Patienten transporteras från avdelningen på rullvagn alternativt ny säng och sängkläder.
- Duoderm eller Comfeelplatta appliceras på eventuella sår.

Preoperativt

- Patienten transporteras till operation när operationspersonalen är redo att ta emot, och tas in direkt på operationssal (får ej placeras i vänthall). Sängen återförs därefter till avdelningen.
- Vid risk för luftburen smitta bör patienten opereras på operationssal som nås från utsidan av operationsavdelningen.
- Plocka bort onödigt material från operationssalen.
- Ett genomräknings-skåp ska vara tomt för leverans av extramaterial till operationssalen. Övriga skåp får ej öppnas från operationssalen. Iakttag noggrann handdesinfektion innan material tas ut ur genomräknings-skåpet.
- Operationsbordet kläs med engångslakan.

- Skylta  vid ingångar till salen.

- Osteril personal använder skyddsrock av engångsmaterial, munskydd. Handskar används vid orent arbete.

- Sterilklädd personal använder engångs operationsrock med barriärskydd på front och ärmar, munskydd med visir.
- Använd plastskor som kan desinfekteras i diskdesinfektor.

Forts MRB - Vårdrutiner operationsavdelning



– för patienter som är bärare av multiresistenta bakterier (MRB)

Peroperativt

- Undvik allt spring ut och in på operationssalen.
- Punktstäda spill med desinfektionsmedel.
- Ren säng in på operationssalen vid avslutad operation. Bordet lämnas på salen för desinfektion.

Postoperativt

- Meddela postoperativ personal 15 min innan operation avslutas.
- Desinfektion av använt material enligt rutin d.v.s.
 - värmedesinfektion
 - manuell rengöring och desinfektion
 - skydda för stänk - desinfektera ytor
- Burkar för preparat, odling, övriga prover avtorkas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel innan de tas ut.
- Slutstädning med Perform 2 % alternativt Virkon 1 % (Virkon skall vara 3 % till tuberkulos och sporbildande bakterier). Medicinsk utrustning avtorkas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel t ex LT-cin eller skyddas med plast under operation.
- Skyddskläder lämnas kvar i respektive säck på salen, skor byts innan man går ut.
- Händer och underarmar spritas.
- Personalen rengör och desinfekterar skor, därefter händer och byter arbetsdräkt efter avslutad op.

Tvätt

Läggs i vanlig tvättsäck på operationssalen som packas i gul plastsäck märkt "TVÄTT" alternativt i vattenlöslig plastsäck som placeras i plastsäck märkt "TVÄTT".

Sopor

- Läggs i konventionellt avfall.
- Riskavfall d v s kraftigt nedblodat eller nedsmutsat avfall, allt avfall från patient med samhällsfarlig sjukdom som hepatit A, E, tuberkulos eller annan sjukdom där avfallet kan medföra särskild smittrisk läggs i plastsäck som läggs i riskavfallskartong.