

HTLV I och II

Smittskyddsläkarnas s.k. Smittskyddsblad

HTLV-I och HTLV-II är virus med låg smittsamhet. De kan överföras från människa till människa vid samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. Virus kan också överföras via blod t ex då man delar spruta eller annan vävnad från smittad person. De smittar inte vid vanliga sociala kontakter.

HTLV är inte att förväxla med HIV och kan inte ge upphov till AIDS. Den som har fått en HTLV-infektion har så långt vi vet idag, virus kvar hela livet, men de flesta får aldrig några sjukdomsbesvär. Några procent av de som smittas med HTLV-I och II får, oftast först efter många år, symtom på sjukdom. Det kan t ex vara en typ av cancer i lymfsystemet kallad adult T-cells leukemi eller lymfom (ATL) eller en sjukdom i nervsystemet som ger symtom från muskler speciellt i nedre delen av kroppen, kallad HTLV associerad myelopati (HAM) eller tropisk spastisk parapares (TSP). Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige.

För att förhindra att andra smittas bör Du iakta följande

- När Du söker sjuk- eller tandvård, informera om Din infektion.
- Ge inte blod, donera inte sperma, bröstmjolk eller något organ.
- Dela inte spruta, spets eller uppdragningskärl med någon.
- Använd kondom vid samlag med tillfällig partner.

Amma inte Ditt barn.