

Stramadag – Arlandia

25 maj 2011

Stramarådet/SMI 26 maj 2011

UVI-mål

- Kinoloner ska användas till högst 5 % av de som behandlas mot någon form av nedre urinvägsinfektioner

Sepsis

- Cirka 40 % av alla som dör i sepsis har en Staf aureussepsis. Att täcka upp för gram-positiva bakterier är därför det viktigaste när man behandlar sepsis NUD.

Primärvårdsstatistik

- 24 % av besöken i primärvård har infektions-orsak.
- Luftvägar står för 17 %
- Hud för 3 %
- Av alla som har cystit väljer man att antibiotikabehandla 86 %

Primärvårdskvalitet

Sven.Engström@lj.se

- Generellt ser man att man överskattar sin egen kvalitet.
- Man följer riktlinjer i långt mindre omfattning än man tror.

Swebar; Samling av resistensdata på nationell bas

- Tidig varning
- Bättre underlag
- Enhetlig systematisk registrering
- Snabb återkoppling
- Data samlas automatiskt och skickas till SMI
- Just nu 5 piloter
- Analytix (Karlstad) kan inte hantera detta ännu

Det svårt sjuka barnet

Inge Axelsson, barnkliniken Östersund

- Rädda liv genom tidig diagnos
- Undvika defensiv medicin, vilket innebär att man i första hand vidta åtgärder för att dämpa den egna ångesten.

Svår bakteriell infektion måste upptäckas men inte överdiagnostiseras

- Sepsis/meningit
- Pneumoni
- Pelonefrit
- Septisk artrit/osteomyelit

Det engelska ljussystemet

- Grönt ljus – lugnt
- Gult ljus – extrem vaksamhet
- Rött ljus – Till barnklinik

Indikationer på Gult

- Svarar inte normalt på sociala signaler
- Svårväckt
- Nedsatt aktivitetsnivå
- Feber > 5 dygn
- Ler inte
- Reagerar ändå på undersökningen

Indikationer på Rött 1

- Reagerar *inte* på undersökningen.
- Vaknar inte eller somnar om efter undersökningen
- Beter sig sjukt enligt föräldrarna
- Svagt skrik
- < 3mån temp > 38 grader
- Barn 3- 6 månader > 39 grader
- Större barn kan vara subfebrila
- Utslag som inte kan tryckas bort

Indikationer på Rött 2

- Buktande fontanell
- Nackstyvhet
- Svullnad eller svår smärta i arm eller ben.
- Vägrar använda arm eller ben
- Gallfärgade kräkningar
- Kapillär återfyllnad dröjer mer än 3 sekunder

Pulsoximeter

- Normalvärde $> 95 \%$
- Om $< 92\%$ till sjukhus med syrgas
- Sträva alltid efter att hålla POX $> 92 \%$
- Alla vårdcentraler bör ha pulsoximeter